

Fiche MEMO

ADMINISTRER LA NALOXONE

La naloxone

Nalscue® contient un antidote aux opioïdes (Héroïne, Méthadone, Skénan®, Subutex®, Oxycodone®, Oxycontin®, Moscontin®, Fentanyl®). Il n'est pas efficace pour les overdoses occasionnées par la consommation de cocaïne, benzo-diazépines ou tout autre produit psychotrope non opioïde.

Même si vous n'êtes pas certain que la personne fait une overdose vous pouvez utiliser Nalscue®, il n'a pas d'effet nocif sur la santé. Pensez que son utilisation peut sauver la vie !




1



Avant d'administrer Nalscue®

- Appeler le secours 15 ou 112
- Allongez la personne sur le dos
- Basculez prudemment la tête de la personne en arrière afin de libérer les voies respiratoires

2



Utilisation de Nalscue®

- Sortez les deux pulvérisateurs de la boîte. Ne testez pas les pulvérisateurs, cela les viderait.
- Tenez le pulvérisateur entre les doigts et le pouce. Surtout n'appuyez pas avant qu'il soit dans la narine.
- Introduisez le premier pulvérisateur complètement dans la narine vers l'aile du nez. Appuyez fermement sur le piston jusqu'à entendre un « Click ». Introduisez le deuxième pulvérisateur dans la deuxième narine et répétez le même geste.
- Notez l'heure à laquelle vous avez pulvérisé Nalscue®.


3



Après utilisation de Nalscue®

Si la personne respire placez la sur le côté (position latérale de sécurité - PLS), surveillez là jusqu'à l'arrivée des secours.

4



Deuxième utilisation de Nalscue®

- Si la personne ne donne pas de signe de réveil au bout de 3 à 5 minutes après pulvérisation de Nalscue®, faites à nouveau deux pulvérisations : une dans chaque narine
- A l'arrivée des secours, remettez les pulvérisateurs usagés aux secouristes et précisez (si vous le savez) la substance que la personne a consommée.