



Nom du médicament

NALSCUE 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose



Composition

Chaque pulvérisateur de 0,1 ml contient 0,9 mg de chlorhydrate de naloxone anhydre

Présentation

Une boîte contient 2 doses de naloxone, réparties dans 4 pulvérisateurs à usage unique : chaque pulvérisateur ne servira qu'une seule fois, dans une seule narine.

Indications thérapeutiques

La solution pour pulvérisation nasale NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml est indiquée dans le traitement d'urgence des surdosages aux opiacés :

- Que ces surdosages soient certains ou suspectés
- Lorsqu'ils se manifestent par une dépression respiratoire
- Chez l'adulte et chez l'enfant dès 1 mois
- Dans l'attente d'une prise en charge par les équipes d'urgence

Contre-indication

L'utilisation de la solution pour pulvérisation nasale NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml est contre-indiquée chez le nouveau-né.

Posologie

Une dose de NALSCUE® à administrer correspond à 1,8 mg de chlorhydrate de naloxone.

- La première dose de naloxone correspond à l'administration de 2 pulvérisations, soit 2 x 0,9 mg de naloxone (on utilise un pulvérisateur de NALSCUE® par narine).
- Si la fréquence respiratoire de la victime ne s'améliore pas (inférieur à 10 à 12 inspirations par minute) dans les 3 à 5 minutes qui suivent, ou si les signes de surdosage réapparaissent, on administre alors la deuxième dose, qui correspond à 2 autres pulvérisations (on utilise de nouveau un spray par narine).

Mode d'administration

NALSCUE® ne peut s'administrer que par voie nasale. Chaque pulvérisateur à usage unique, doit être utilisé dans une seule narine.

Mises en garde & précautions d'emploi

Des instructions doivent être fournies aux personnes à qui on prescrit et/ou dispense la naloxone (consommateurs d'opiacés ou leur entourage) :

- ① L'administration de la solution pour pulvérisation nasale NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml ne se substitue pas à une prise en charge par les équipes d'urgence. En cas de surdose aux opiacés, l'appel des secours (aux numéros 15 ou 112) reste le 1er geste à effectuer.
- ② La victime d'une surdose doit être allongée sur le dos.
- ③ Chaque pulvérisateur doit être utilisé dans une seule narine et est à usage unique. Il ne faut donc jamais tester les pulvérisateurs avant de s'en servir.

A savoir

- Dans certains cas, l'administration de NALSCUE® peut générer un syndrome de manque. Il est indispensable d'informer la victime de la nécessité de ne pas consommer d'opiacés pendant plusieurs heures pour éviter l'apparition d'une nouvelle surdose.
- Après administration de NALSCUE®, si la fréquence respiratoire s'améliore, il faut mettre le patient en PLS et attendre l'arrivée des services d'urgence. En revanche, si le patient ne respire pas, des gestes de premiers secours seront nécessaires tel que le massage cardiaque. Les régulateurs téléphoniques des pompiers ou du SAMU pourront vous conseiller sur la conduite à tenir.